

# ମଧୁର ଜଳରେ ମୋତି ରୂପ



ବିଷୟ ବସ୍ତୁ

ଡ. ସୁନୀଲ କୁମାର ମହାପାତ୍ର

ଡ. ସୁଭାଶିଷ ଦାସ

ବିଜୟ କୁମାର ରାଉତରାୟ

ସଂପାଦନା

ଡ. ସୁନୀଲ କୁମାର ମହାପାତ୍ର

ବରିଷ୍ଠ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଓ ମୁଖ୍ୟ



କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର, ଯାଜପୁର

ଓଡିଶା କୃଷି ଓ ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ଭୁବନେଶ୍ୱର



**ଆଲୋଚ୍ୟ :**

ଡ. ସୁନୀଲ କୁମାର ମହାପାତ୍ର  
ବରିଷ୍ଠ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଓ ମୁଖ୍ୟ  
ଡ.ସୁଭାଶିଷ ଦାସ  
ବୈଜ୍ଞାନିକ ମୂଲିକା ବିଭାଗ  
ବିଜୟ କୁମାର ରାଉତରାୟ  
ବୈଜ୍ଞାନିକ ଶାସ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ

**ସଂପାଦନା :**

ଡ. ସୁନୀଲ କୁମାର ମହାପାତ୍ର  
ବରିଷ୍ଠ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଓ ମୁଖ୍ୟ

**ପ୍ରକାଶକ :**

କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର, ଯାଜପୁର, ବଡ଼ଚଣା

**ପ୍ରଥମ ସଂସ୍କରଣ : ୨୦୨୩**

**ମୁଦ୍ରଣ :** ଶ୍ରୀମା ଗ୍ରାଫିକ୍ସ, ଶହୀଦ ନଗର, ଭୁବନେଶ୍ୱର

# ମଧୁର ଜଳରେ ମୋତି ଗୁଣ



-: ବିଷୟବସ୍ତୁ :-

**ଡ. ସୁନୀଲ କୁମାର ମହାପାତ୍ର**

ବରିଷ୍ଠ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଓ ମୁଖ୍ୟ

**ଡ. ସୁଭାଶିଷ ଦାସ**

ବୈଜ୍ଞାନିକ ମୂଢ଼ିକା ବିଭାଗ

**ବିଜୟ କୁମାର ରାଉତରାୟ**

ବୈଜ୍ଞାନିକ ଶସ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ

-: ସମ୍ପାଦନା :-

**ଡ. ସୁନୀଲ କୁମାର ମହାପାତ୍ର**

ବରିଷ୍ଠ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଓ ମୁଖ୍ୟ



**କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର, ଯାଜପୁର**

ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଓ ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ଭୁବନେଶ୍ୱର



## ମଧୁର ଜଳରେ ମୋତିଗୁଣ

ଓଡ଼ିଶାର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ସାଧାରଣତଃ ମଧୁର ଜଳରେ ମୋତିଗୁଣ କରାଯାଏ । ଏହା ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଦେଖାଯାଏ । (୧) ଗୋଲ ମୋତି (୨) ଡିଜାଲନର ମୋତି । ଭାରତ ଉପମହାଦେଶରେ ମିଳୁଥିବା ମଧୁର ଜଳ ଶାମୁକା-

**ଲାମେଲିଡେନ୍ ମାର୍ଜିନାଲିସ୍ :** କେବଳ ମୁକ୍ତା ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ନ ହୋଇ ମଣିଷର ଖାଦ୍ୟ, ଛୋଟ ଜୀବମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ, ବୋତାମ, ଔଷଧ, ଚୂନ ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଉପରୁ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ପାରିବ । ଏହା ଗ୍ରାମୀଣ ତଥା ସହରାଞ୍ଚଳର ମଧୁର ଜଳରାଶିରୁ ମିଳିଥାଏ । ଲାମେଲିଡେନ୍ ନଗୋଟି ପ୍ରଜାତିରେ ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ନଦୀରେ ମିଳୁଥିବା ପେରେସିଆ ଶାମୁକା ମାଝଟି ପ୍ରଜାତିରେ ମିଳିଥାଏ । **ଲାମେଲିଡେନ୍ ମାର୍ଜିନାଲିସ୍, ଲାମେଲିଡେନ୍ କୋରିଆନ୍ ଓ ପେରେସିଆ କୋରୁଗାଟା** ସାଧାରଣତଃ ମଧୁରଜଳ ମୁକ୍ତା ଉତ୍ପନ୍ନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ ।

ଗୋଲ ମୋତି ଗୁଣ ଭାରତ ବାହାରେ ଚାଷ କରାଯାଏ । କିନ୍ତୁ ଡିଜାଲନର ମୋତି ଚାଷ ଆମ ଭାରତରେ ବହୁଳ ପରିମାଣରେ ଚାଷ କରାଯାଇ ପାରୁଛି । ଡିଜାଲନର ମୋତି ସାଧାରଣତଃ ଭାରତ ଓ ବାଂଲାଦେଶ ପ୍ରଭୃତି ଦେଶମାନଙ୍କରେ ଚାଷ କରାଯାଏ ।

### ମୋତିଚାଷ ପାଇଁ ଜଳର ଗୁଣ କିପରି ହେବା ଦରକାର:

ମୋତି ଚାଷ ପାଇଁ ପୋଖରୀର ଜଳ ପ୍ରଥମେ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଏ ଜଳର ପିଏଚ୍ ୭.୦-୭.୫ ଓ ଆମୋନିଆ ‘୦’ ହେବା ଦରକାର । ଏହି ମାତ୍ରା ଠାରୁ ଅଧିକ ପିଏଚ୍ ହୋଇଗଲେ ଚୂନ ଏକ ହେକ୍ଟର ପୋଖରୀ ପାଇଁ ୨୦୦ କେଜି ବର୍ଷକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରି ପିଏଚ୍ ମାତ୍ରାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇ ପାରିବ । ମଧୁର ଜଳରେ ମୋତି ଚାଷ କରାଯାଏ । ମୋତି ଚାଷ ପାଇଁ ପୋଖରୀର ବୟସ ୩ ବର୍ଷ କିମ୍ବା ୩ ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହୋଇଥିବା ଦରକାର । ପୋଖରୀର ତଳଭାଗରେ ମାଟି ଓ କାଦୁଆ ପରିବେଶ ରହିଥିବା ଉଚିତ୍ ଏବଂ ପୋଖରୀର ମଧ୍ୟକୁ ପାଣି ଆସିବା ଓ ନିଷ୍କାସନର ସୁବିଧା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ।

## ମୋତି ଚାଷ ପାଇଁ କେଉଁକେଉଁ ଦିଗ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ।

ମୋତି ଚାଷ ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଶାମୁକା ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଏ । ଏହା ସାଧାରଣତଃ ପୋଖରୀ ମାନଙ୍କରୁ ମିଳିଥାଏ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶାମୁକାର ଲମ୍ବ ୮-୧୦ ସେ.ମି. ଓ ଓଜନ ପ୍ରାୟ ୫୦ ଗ୍ରାମ୍ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ । ଶାମୁକା ମଧ୍ୟ ହ୍ୟାଟେରୀ ମାନଙ୍କରୁ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଏ । ଏହି ହ୍ୟାଟେରୀଗୁଡ଼ିକ କଳିକତା, ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଓ ମୁମ୍ବାଇ ସହରମାନଙ୍କରେ ଅଛି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୋଖରୀରେ ୨ ଲକ୍ଷ ବ୍ୟାସର ବାଉଁଶ ଦ୍ଵାରା ଭାଡ଼ି କରିଦିଆଯାଏ । ଭାଡ଼ିରୁ ନାଲଲନ୍ ବ୍ୟାଗ ଗୁଡ଼ିକ ଝୁଲୁଥାଏ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟାଗ ଭିତରେ ଦୁଇଟି ଶାମୁକା ରହି ସ୍ଵଚ୍ଛନ୍ଦରେ ନିଶ୍ଵାସ ପ୍ରଶ୍ଵାସ ନେବା ଓ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଥାଏ । ସେହି ଶାମୁକା ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଲଲନ୍ ବ୍ୟାଗ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇଟି କରି ରଖାଯାଏ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏକ ମିଟର ଗଭୀରରେ ପାଣି ମଧ୍ୟରେ ଝୁଲାଇ ରଖାଯାଏ । ଏହିପରି ହିସାବରେ ପ୍ରତି ହେକ୍ଟର ପିଛା ୫୦,୦୦୦-୭୫,୦୦୦ଟି ଶାମୁକା ପାଳନ କରାଯାଇ ପାରିବ ।

ପୋଖରୀରେ ବହୁଥିବା ପୁରକ, ଶାମୁକା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଅଟେ । ସାମୟିକ ଭାବେ ସବୁଜ ପାଣି (କ୍ଲୋରେଲା, କ୍ଲୋରୋକୋକମ୍, ସିନେଡେସମସ୍)କୁ ପୋଖରୀରେ ଯୋଗାଇ ଦେବା ଦ୍ଵାରା ସାମୁକା ଗୁଡ଼ିକୁ ସୁଖାଦ୍ୟ ମିଳିଥାଏ ଓ ମୁକ୍ତା ଉତ୍ପାଦନ ଉତ୍ତମ ହୋଇଥାଏ । ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୋଖରୀର ସୁବିଧା ନାହିଁ, ସେଠାରେ ଏଫ୍.ଆର.ପି ଟାଙ୍କି ବା ଆକ୍ଵାରିୟମରେ ବାୟୁ ସଂଚଳନ ଓ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇ ସ୍ଵଚ୍ଛ ପରିମାଣରେ ଶାମୁକାକୁ ପାଳନ କରାଯାଇ ପାରିବ ।

## ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ପଦ୍ଧତି

ଶାମୁକା ସଂଗ୍ରହ କଲା ପରେ ଏହାକୁ ସଫା ପାଣିରେ ଭଲଭାବରେ ଧୋଇଦେବା ଦରକାର । ଏହାପରେ ଏକ କୁଣ୍ଡରେ ଶାମୁକା ଗୁଡ଼ିକୁ ଛାଡ଼ିଦେଇ ସେଥିରେ ହଳଦୀ ପାଉଡର ସିଞ୍ଚନ କରି ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଏ । ଏହା ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ପରି କାମ କରେ ଓ ଶାମୁକାରେ ଥିବା ଜୀବାଣୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ । ସୁସ୍ଥ ଶାମୁକା ଗୁଡ଼ିକୁ ପୋଖରୀରେ ଛଡାଯାଏ । ପାଣିରେ ଶାମୁକା ଗୁଡ଼ିକୁ ଛାଡ଼ିବାର ୧-୨ ଦିନ ପରେ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରାଯୁଏ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶାମୁକାକୁ ସାବଧାନତାର ସହିତ ଧରି ଗୋଟିଏ ଟିମୁଟା ମାଧ୍ୟମରେ

ଦୁଇ ଖେଳାପାକୁ ୦.୮-୧.୦ ସେ.ମି ଓସାରରେ ଖୋଳି ଦିଆଯାଇଥାଏ । ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ଶାମୁକାକୁ ଅଷ୍ଟୋପଚାର ନିମିତ୍ତ ଚିମୁଟା ମଧ୍ୟରେ ରଖାଯାଏ । ଶାମୁକାର ଆଗପାଖରେ ଥିବା ଝିଲ୍ଲା ବା ପରଦାର ମଝି ଅଂଶକୁ ସତର୍କତାର ସହିତ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଛିଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଏ । ଆକୃତିଧାରୀ ନାଭିକେନ୍ଦ୍ର ବା ବାହ୍ୟ ବସ୍ତୁଟିକୁ ପତଳା ଚିମୁଟା ସାହାଯ୍ୟରେ ଶାମୁକାର ଝିଲ୍ଲା ଗର୍ଭ ମଧ୍ୟକୁ ରଖାଯାଇ ଧିରେଧିରେ ପଶାଯାଏ ଯେପରି ଗହ୍ୱର ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାପନ ହୋଇ ପାରିବ । ଉଠାଯାଇଥିବା ଚମଡ଼ା ଝିଲ୍ଲା ବା ପରଦାଟିକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଏ । ଏହି ପ୍ରଣାଳୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଶାମୁକାର ଅପର ପାଖ ଝିଲ୍ଲା ଗର୍ଭରେ ବାହ୍ୟ ବସ୍ତୁ ରୋପଣ କରାଯାଏ । ଶାମୁକାକୁ ଅପରେସନ୍ ପରେ ୮ ମାସରୁ ୧୨ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଳନ ପୋଖରୀରେ ରଖାଯାଏ ।

### ଅଷ୍ଟୋପଚାରର ପରିବର୍ତ୍ତା ଯତ୍ନ:

ଶାମୁକା ମଧ୍ୟରେ ବାହ୍ୟବସ୍ତୁ ବା ନାଭିକେନ୍ଦ୍ରଟିକୁ ସ୍ଥାପନ କରିସାରିବା ପରେ ଶାମୁକା ଗୁଡ଼ିକୁ ‘ଅପରେସନ୍ ପରିବର୍ତ୍ତା ଯତ୍ନ’ ଖୁଆଡରେ ରଖାଯାଏ ।

ଶାମୁକା ପେଟ ପାଖକୁ ଉପର କରି ନାଭିଲିନ୍ ବ୍ୟାଗ୍(୩୦ ସେମି × ୧୨ ସେମି) ମଧ୍ୟରେ ଅପରେସନ୍ ହୋଇଥିବା ଶାମୁକାକୁ ୨ଟି ଲେଖାଏଁ ରଖାଯାଏ । ଏହିପରି ଭାବରେ ୭-୧୦ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖାଯାଏ ।

ଏହାର ଖାଦ୍ୟ ଭାବେ କିଛି ‘ସବୁଜ ପାଣି’ ଦିଆଯାଏ । ଏହି ‘ସବୁଜ ପାଣି’ ଶାମୁକାକୁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇଥାଏ ।

ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଟାଙ୍କିରେ କିଛି ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଯଥା ‘କ୍ଲୋରାମ୍ ଫେନିକଲ୍’ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ । ପ୍ରତ୍ୟେକ କୁଣ୍ଡ ବା ଟାଙ୍କିରେ ୧-୨ ପିପିଏମ୍‌ର ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଦିଆଯାଏ । ଏହି ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍, ଶାମୁକାର ଘା’ ଶୁଖାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ।

ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶାମୁକାମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରାଯାଏ । ମୃତ ଶାମୁକା ବା ଯେଉଁ ଶାମୁକାରୁ ନାଭିକେନ୍ଦ୍ର ବାହାରି ଯାଇଥାଏ ତାକୁ ନାଭିଲିନ୍ ବ୍ୟାଗ୍‌ରୁ ବାହାର କରିଦିଆଯାଏ ।

ଏହି ୭-୧୦ ଦିନ ପରେ ସମସ୍ତ ଜୀବନ୍ତ ଓ ସୁସ୍ଥ ଶାମୁକାକୁ ପାଳନ ପୋଖରୀକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଏ ଓ ସେଠାରେ ପାଳନ ପାଇଁ ରଖାଯାଏ ।

## ସତର୍କତା:

- ❖ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ନିମ୍ନେନ୍ତ କେବଳ ସୁସ୍ଥ ଓ ବଡ଼ ଶାମୁକା ଚୟନ କରିବାକୁ ହୁଏ ।
- ❖ ଏଥିପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କତା ରହିବାକୁ ପଡେ, ଯେପରିକି ଶାମୁକା ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷତ ନହୁଏ ।
- ❖ ବଳପୂର୍ବକ ଶାମୁକାକୁ ଖୋଲାଯାଏ ନାହିଁ ।
- ❖ ଏକ ସେମିରୁ ଅଧିକ ଖୋଲିବା ଦ୍ଵାରା ଶାମୁକାର ମାଂସପେଶୀ ଛିଣ୍ଡିଯାଏ ।
- ❖ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଓ ପରେ ଶଲ୍ୟ ଉପକରଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲଭାବେ ସଫାକରି ଜୀବାଣୁ ରହିତ କରାଯିବା ଉଚିତ୍ ।
- ❖ ଶାମୁକାର ଆକାର ଅନୁସାରେ ତଦନୁରୂପ ଆକାରର ବାହ୍ୟବସ୍ତୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ ।

## ହ୍ୟାଲ୍‌ସ୍ ସିଡ୍‌ସ୍ କ'ଣ ?

ଏହା ଶାମୁକା ପାଉଁଶର, ମାର୍ବଲ ପାଉଁଶର ଓ କେମିକାଲ (Araldite)ର ମିଶ୍ରଣରେ ତିଆରି କରାଯାଏ । ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ୨-୩ଟଙ୍କାରୁ ନେଇ ୩୦ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିଥାଏ ।

Operation ମାଧ୍ୟମରେ Nucleus Seedsକୁ ଛାଡ଼ିବାର ୪୮ ଘଣ୍ଟା ପରେ Antibiotic Treatment କରିବାକୁ ପଡିଥାଏ । Calvam 625mgକୁ ୨୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରାଯାଏ ।

ପୋଖରୀରେ ଶାମୁକା ଗୁଡ଼ିକ ଛାଡ଼ିଲା ବେଳେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଯେପରି ଶାମୁକା ଗୁଡ଼ିକ ୩ ଫୁଟ ଗଭୀର ପାଣି ଭିତରେ ରହିବେ । ଏହାକୁ କରିବା ପାଇଁ ଶାମୁକା ଗୁଡ଼ିକୁ ସୁତା ସାହାଯ୍ୟରେ ବାନ୍ଧି ଏକ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବୋତଲ ସାହାଯ୍ୟରେ ପୋଖରି ଭିତରକୁ ଛଡ଼ାଯାଏ । ଯେପରି ଶାମୁକା ଗୁଡ଼ିକ ପାଣି ଭିତରେ ସମାନ ୩ଫୁଟ ଗଭୀରରେ ରହିବ ଓ ବୋତଲ ଗୁଡ଼ିକ ପାଣି ଉପରେ ଭାସି ରହିବ । ଶାମୁକା ଛାଡ଼ିବାର ୩ ଦିନ ପରେ ଏହାକୁ ତଦାରଖ କରାଯାଏ । ମରିଥିବା ଶାମୁକା ଗୁଡ଼ିକୁ ବାହାର କରଦିଆଯାଏ । କାରଣ ମଲା ଶାମୁକା ରହିଲେ ପାଣି ପ୍ରଦୂଷିତ ହେବ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଶାମୁକାକୁ କ୍ଷତି ହୋଇଥାଏ ।

## ମଲା ଶାମୁକାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବେ କିପରି ?

ମଲା ଶାମୁକା ମୁହଁଟା ଟିକେ ଖୋଲି ହୋଇଯାଏ । ଏହା ଭିତରେ ପାଣି ପଶି ଶାମୁକା ଭିତରେ ଥିବା ମାଂସାଳିଆ ଅଂଶ ପଡ଼ିଯାଏ । ଏହା ଦ୍ଵାରା ଜୀବାଣୁ ପାଣି ଭିତରେ ବ୍ୟାପିଥାଏ ।

### ଖାଦ୍ୟ ଓ ସାରର ବ୍ୟବହାର:

ଶାମୁକା ଗୁଡ଼ିକୁ ଛାଡ଼ିବା ପରେ ଖାଦ୍ୟସାର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ । ଶାମୁକା କୃଷି ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟସାର ପ୍ରୟୋଗ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଦରକାର । ଏକ ୨୦' x ୨୦' ପୋଖରୀରେ ପ୍ରାୟ ୨୦୦୦ ଶାମୁକା ଛଡ଼ାଯାଏ । ଏହା ପାଇଁ ନିମ୍ନ ଲିଖିତ ଖାଦ୍ୟସାର ହେଲା -

୧) ପିଡ଼ିଆ- ୨ କେଜି

୨) ଗୋବର- ୪ କେଜି

୩) ଯୁରିଆ- ୨ କେଜି

୪) ଫସଫରସ୍- ୨୫୦ ଗ୍ରାମ୍

୫) ପଟାସ୍- ୧୦୦ ଗ୍ରାମ୍

ଏକ ପାତ୍ରରେ ଉପର ଲିଖିତ ଖାଦ୍ୟସାରକୁ ମିଶ୍ରଣ କରି ପୋଖରୀରେ ସିଞ୍ଚନ କରାଯାଏ । ପ୍ରତି ୧ ମାସ ଓ ୨ ମାସ ଅନ୍ତରରେ ଉପର ଲିଖିତ ଖାଦ୍ୟ ସାରକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ । ଏହାକୁ ଦେବା ଫଳରେ ଶାମୁକାର ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେ Planktonର ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ । Plankton ଶାମୁକା ବୃଦ୍ଧି ଓ ତା'ର ଖାଦ୍ୟ ପରି କାମ କରିଥାଏ ।

### ସାମୁକାର ରୋଗ ପରିଚ୍ଛେଦନା :

ଶାମୁକା ଗୁଡ଼ିକ ପାଣିରେ ଥିବା ବେଳେ କିଛି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାନ୍ତି । ଏହାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ହଳଦୀ ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରାଯାଏ । ପ୍ରଥମେ ଶାମୁକା ଛାଡ଼ିଲା ବେଳେ ଏକ ଚାମଚ ହଳଦୀ ୧୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଯାଏ ଏବଂ ମିଶ୍ରିତ ପାଣିରେ ଭଲଭାବେରେ Treatment କରାଯାଏ । ପ୍ରତି ୫ ଦିନ ଅନ୍ତରରେ ଏହାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଏ । ମଲା ଶାମୁକା ଗୁଡ଼ିକ ପାଣିରୁ ବାହାର କରିଦିଆଯାଏ । କାରଣ ଏହା ରହିଲେ ଅନ୍ୟ ଶାମୁକାକୁ

କ୍ଷତି ହୋଇଥାଏ । ଛାତିବାର ୪୮ ଘଣ୍ଟା ପରେ Calvam 625mg Antibiotic କୁ ୨୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରାଯାଏ । ମରିଯାଇଥିବା ଶାମୁକାକୁ ପାଣିରୁ ବାହାର କରିଦିଆଯାଏ । ପ୍ରତି ୩ମାସ ଅନ୍ତରରେ ଏହାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ ।

## ମୋତି ତାଷ ସହ ମାଛ ତାଷ କରିହେବ କି ନାହିଁ ?

ମୋତି ତାଷ ସହିତ ମାଛ ତାଷ କରିହେବ । ପରୀକ୍ଷାରୁ ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ୨୦' × ୨୦' ପୋଖରୀରେ ମୋତି ତାଷ ସହିତ ପୋହଳା ମାଛ ତାଷ କରିହେବ । ଏଥିପାଇଁ ୨ କେଜି ପୋହଳା ମାଛ ଜାଆଁଳ ଛଡ଼ାଯାଏ । ଯେଉଁ ପୋଖରୀରେ 'କାର୍ପ' ଜାତୀୟ ମାଛତାଷ ହୋଇପାରେ, ସେଭଳି ପୋଖରୀରେ ଶାମୁକା ପାଳନ ମଧ୍ୟ ହୋଇ ପାରିବ ।

## ଅମଳ :

ଶାମୁକା ଛାତିବାର ୧୨-୧୩ ମାସ ପରେ ସାଧାରଣତଃ ମୋତି ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ଯାଇଥାଏ । ଏହାକୁ ଅମଳ କଲା ପରେ ମୋତି ପରୀକ୍ଷାଗାରକୁ ପଠାଯାଏ । ପରୀକ୍ଷାଗାରରେ ଏହାର ମାନ ପରୀକ୍ଷା କରି Grading କରାଯାଏ । ବଜାରରେ ଗ୍ରେଡ୍ ଅନୁସାରେ ମୋତି ମୂଲ୍ୟ ନିରୂପଣ କରାଯାଏ ।

ଗ୍ରେଡ୍ ଏ- ଟ.୩୦୦/-

ଗ୍ରେଡ୍ ବି- ଟ.୨୦୦/-

ଗ୍ରେଡ୍ ସି- ଟ.୧୦୦/-

## ଲାଭ ଓ କ୍ଷତି:

୧୦୦୦ ମୋତି ପାଇଁ ଏକ ଲାଭକ୍ଷତି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି । ଏକ ହଜାର ଶାମୁକାରୁ ମୋତି ପାଇ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ଟ.୩୫୦୦/- ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥାଏ । ଏକହଜାର ଶାମୁକାରୁ ପ୍ରାୟ ୨୦୦୦ ମୋତି ମିଳିଥାଏ । ଏହାର ଲାଭ ଆମ ଗ୍ରେଡ୍ ଅନୁସାରେ ମିଳିଥାଏ ।

ଗ୍ରେଡ୍ ‘ଏ’ ଲାଭ- ଟ. ୬ ଲକ୍ଷ

ଗ୍ରେଡ୍ ‘ବି’ ଲାଭ- ଟ. ୪ ଲକ୍ଷ

ଗ୍ରେଡ୍ ‘ଏ’ ଲାଭ- ଟ. ୨ ଲକ୍ଷ

**ଏହି ଚାଷ ପାଇଁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ କେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନରୁ ତାଲିମ୍  
ନେଇ ପାରିବେ ?**

ଏହି ଚାଷ ପାଇଁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ନିକଟସ୍ଥ କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର, ଯାଜପୁର କିମ୍ବା  
CIFAରୁ ମଧ୍ୟ ତାଲିମ୍ ନେଇପାରିବେ ।



